

**SMECTA 3 g FRAISE, poudre pour suspension buvable en sachet. COMPOSITION :** Diosmectite 3,000 g pour un sachet. **Excipients :** glucose monohydraté, saccharine sodique, arôme fraise (maltodextrine, propylène glycol, gomme arabique, mélange d'arômes naturels et de synthèse). Excipients à effet notoire : glucose, propylène glycol. **FORME PHARMACEUTIQUE :** poudre pour suspension buvable. **DONNEES CLINIQUES :**

**Indications thérapeutiques :** Traitement de la diarrhée aiguë chez l'enfant de plus de 2 ans en complément de la réhydratation orale et chez l'adulte. Traitement symptomatique de la diarrhée fonctionnelle chronique chez l'adulte. Traitement symptomatique des douleurs liées aux affections intestinales fonctionnelles chez l'adulte. **Posologie et mode d'administration :** **Posologie :** **Traitement de la diarrhée aiguë :** *Chez l'enfant à partir de 2 ans :* 4 sachets par jour pendant 3 jours puis 2 sachets par jour pendant 4 jours. *Chez l'adulte :* En moyenne 3 sachets par jour pendant 7 jours. En pratique, la posologie quotidienne peut être doublée en début de traitement. **Autres indications :** *Chez l'adulte :* En moyenne 9 grammes (3 sachets) par jour. **Mode d'administration :** Voie orale. Le contenu du sachet doit être mis en suspension juste avant utilisation. Chez l'enfant, le contenu du sachet peut être délayé dans un biberon de 50 ml d'eau à répartir au cours de la journée, ou bien mélangé à un aliment semi-liquide : bouillie, compote, purée, "petit-pot"... Chez l'adulte, le contenu du sachet peut être délayé dans un demi-verre d'eau. **Contre-indications :** Hypersensibilité à la diosmectite ou à l'un des excipients mentionnés à la rubrique Excipients. **Mises en gardes spéciales et précautions d'emploi :** La diosmectite doit être utilisée avec précaution chez les patients présentant des antécédents de constipation chronique sévère. Chez le nourrisson et l'enfant de moins de 2 ans, l'utilisation de SMECTA 3 g FRAISE doit être évitée. Le traitement de référence de la diarrhée aiguë est l'administration de soluté de réhydratation orale (SRO). Chez l'enfant de plus de 2 ans, le traitement de la diarrhée aiguë doit s'effectuer en association avec l'administration précoce d'un soluté de réhydratation orale (SRO) afin d'éviter la déshydratation. L'utilisation chronique de SMECTA 3 g FRAISE doit être évitée. Chez l'adulte, le traitement ne dispense pas d'une réhydratation si celle-ci s'avère nécessaire. L'importance de la réhydratation par soluté de réhydratation orale ou par voie intraveineuse doit être adaptée en fonction de l'intensité de la diarrhée, de l'âge et des particularités du patient. Le patient devra être informé de la nécessité de : •se réhydrater par des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser les pertes de liquide dues à la diarrhée (la ration quotidienne moyenne en eau de l'adulte est de 2 litres). •maintenir l'alimentation le temps de la diarrhée : en excluant certains apports et particulièrement les crudités, les fruits, les légumes verts, les plats épicés ainsi que les aliments ou boissons glacés ; en privilégiant les viandes grillées et le riz. Ce médicament contient du glucose (excipient à effet notoire). Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose. Ce médicament contient 0,128 mg de propylène glycol. **Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions :** Les propriétés adsorbantes de ce produit pouvant interférer avec les délais et/ou les taux d'absorption d'une autre substance, il est recommandé d'administrer tout autre médicament à distance de SMECTA 3 g FRAISE (plus de 2 heures si possible). **Fertilité, grossesse et allaitement :** *Grossesse :* Il n'existe pas de données ou il existe des données limitées (moins de 300 grossesses) sur l'utilisation de SMECTA 3 g FRAISE chez la femme enceinte. Les études effectuées chez l'animal sont insuffisantes pour permettre de conclure sur la toxicité sur la reproduction. SMECTA 3 g FRAISE n'est pas recommandé pendant la grossesse. *Allaitement :* Il existe des données limitées sur l'utilisation de SMECTA 3 g FRAISE au cours de l'allaitement. SMECTA 3 g FRAISE n'est pas recommandé pendant l'allaitement. *Fertilité :* L'effet sur la fertilité humaine n'a pas été étudié. **Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines :** Aucune étude sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'a été réalisée. Toutefois, l'effet attendu est nul ou négligeable. **Effets indésirables :** L'effet indésirable le plus fréquemment rapporté au cours du traitement est la constipation, qui survient chez environ 7 % des adultes et 1 % des enfants. En cas de survenue d'une constipation, le traitement par diosmectite doit être

arrêté, et réintroduit si nécessaire à une dose plus faible. Les effets indésirables rapportés au cours des études cliniques et du suivi post-commercialisation sont listés ci-dessous. Leur fréquence est définie selon la convention suivante : très fréquent ( $\geq 1/10$ ) ; fréquent ( $\geq 1/100$  à  $< 1/10$ ) ; peu fréquent ( $\geq 1/1000$  à  $< 1/100$ ) ; rare ( $\geq 1/10000$  à  $< 1/1000$ ) ; inconnue (ne peut pas être estimée à partir des sources disponibles).

Effets indésirables rapportés au cours des études cliniques et du suivi post-commercialisation :

| Système Classe Organe                         | Fréquence     | Effet indésirable |
|---|---------------|-------------------|
| Affections gastro-intestinales                | Fréquent*     | Constipation      |
|   | Peu fréquent* | Vomissements      |
| Affections de la peau et du tissu sous-cutané | Peu fréquent* | Eruption          |
|   | Rare*         | Urticaire         |
|   | Inconnu       | Angiœdème, prurit |
| Affections du système immunitaire             | Inconnu       | Hypersensibilité  |

\*Fréquence estimée à partir des taux d'incidence observés au cours des études cliniques

**Déclaration des effets indésirables suspectés :** La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance. Site internet : [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr).

**Surdosage :** Un surdosage peut entraîner une constipation sévère ou un bézoard.

**PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES :**

**Propriétés pharmacodynamiques :** Classe pharmaco-thérapeutique : autres adsorbants intestinaux. Code ATC : A07BC05. Il a été démontré en pharmacologie clinique que la diosmectite : ●Adsorbe les gaz intestinaux chez l'adulte, ●Restaure la perméabilité normale de la muqueuse, au cours d'une étude clinique effectuée chez des enfants présentant une gastroentérite. Par sa structure en feuillets et sa viscosité plastique élevée, la diosmectite possède un pouvoir couvrant important de la muqueuse digestive. Les résultats combinés de 2 études randomisées en double aveugle comparant l'efficacité de la diosmectite versus placebo et incluant 602 patients âgés de 1 à 36 mois souffrant de diarrhée aiguë montrent une réduction significative du débit des selles émises au cours des 72 premières heures dans le groupe de patients traités par la diosmectite, en complément de la réhydratation orale.

**Propriétés pharmacocinétiques :** Compte tenu de la structure de la diosmectite, SMECTA 3 g FRAISE reste du côté luminal de l'épithélium digestif. Il n'est ni absorbé ni métabolisé. La diosmectite est éliminée dans les selles selon le processus naturel du transit intestinal.

**DONNEES DE SECURITE PRECLINIQUE :** Les données de sécurité précliniques, obtenues lors d'études conventionnelles de toxicité aiguë et à doses répétées et d'études de génotoxicité, n'ont pas mis en évidence de risque particulier pour l'homme.

**DONNEES PHARMACEUTIQUES :** Durée de conservation : 3 ans. Pas de précautions particulières de conservation.

**Nature et contenu de l'emballage extérieur :** Boîtes de 12 sachets (papier kraft/aluminium/ polyéthylène) contenant 3,76 g de poudre pour suspension buvable.

**DONNEES ADMINISTRATIVES :** Non soumis à prescription médicale. Boîte de 12 sachets : CIP n° 34009 300 079 0 7. Non remboursé sécurité sociale. Non agréé à l'usage des Collectivités. AMM 2013 rév. Avril 2019.

**DATE DE MISE A JOUR :** Avril 2019. **REF :** SCFraise-C-V05

**EXPLOITANT :** IPSEN CONSUMER HEALTHCARE, 65 quai Georges

Gorse, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - Tél : 01.58.33.50.00. Information médicale : 01.58.33.51.16.