

9. Wstrzyknięcie dawki leku

Oczyść skórę dziecka w miejscu podania leku, używając alkoholu lub mydła i wody. Miejsce podania powinno być suche.

Lekko chwyć (uszczypnij) skórę dwoma palcami. Wprowadź igłę tak, jak pokazywał lekarz dziecka. Puść skórę.

Powoli wciskaj tłok strzykawki do końca, aby podać dziecku cały płyn.



10. Wyciągnij igłę i delikatnie przyłóż gazik lub wacik (nie pocieraj).

Wyciągnij igłę i w miejscu iniekcji delikatnie przyłóż na kilka sekund gazik lub wacik.

Nie pocieraj miejsca iniekcji!

Nie nakładaj z powrotem osłonki na strzykawkę. Zużyta igłę i strzykawkę należy włożyć do pojemnika na odpady ostre, który powinien być szczelnie zamknięty i odpowiednio utylizowany.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli u dziecka wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce dołączonej do opakowania, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceutce lub pielęgniarce. Działania niepożądane można też zgłaszać bezpośrednio, na stronie internetowej www.urpl.gov.pl w zakładce „Monitorowanie bezpieczeństwa leków”.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Więcej informacji można znaleźć w ulotce dołączonej do opakowania leku INCRELEX® lub uzyskać, kontaktując się z lekarzem lub pielęgniarką.



Lek INCRELEX® należy podawać dwa razy na dobę.



Lek INCRELEX® należy podawać na krótko przed posiłkiem lub bezpośrednio po posiłku (w ciągu 20 minut).



Jeśli dawki leku INCRELEX® nie można podać krótko przed posiłkiem lub bezpośrednio po posiłku, należy ją pominąć.



Za każdym razem lek należy podawać w inne miejsce.



Nie wolno zwiększać dawki leku INCRELEX® w celu uzupełnienia pominiętej dawki lub kilku pominiętych dawek. Kolejną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

2°C - 8°C



Lek INCRELEX® należy przechowywać w lodówce, ale NIE wolno go zamrażać.



increlex®

mekasermina

Sposób użycia

Ta ulotka zawiera krótki przewodnik dotyczący przygotowania i podawania leku INCRELEX®

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Można pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, jakie wystąpią u dziecka. Informacje na temat sposobu zgłaszania działań niepożądanych można znaleźć na stronie internetowej www.urpl.gov.pl.



920000-01-01116-02/10

INCRELEX® - sposób użycia

Lek Increlex należy podawać, używając jałowych, jednorazowych strzykawek i igieł.

Przygotowanie dawki leku:

1. Umyj ręce

Przed przygotowaniem dawki leku INCRELEX® do iniekcji należy umyć ręce.


2. Za każdym razem używaj nowej igły i strzykawki

Za każdym razem, gdy podajesz lek używaj nowej igły i strzykawki.



3. Przygotuj strzykawkę

Sprawdź, czy płyn jest przezroczysty i bezbarwny - **nie** podawaj leku, jeśli płyn jest mętny lub gdy w roztworze widoczne są substancje stałe. Nie podawaj po upływie terminu ważności. W przypadku nowej fiolki zdejmij kapturek ochronny, ale nie usuwaj gumowego korka, który należy przetrzeć wacikiem nasączonym alkoholem, aby zapobiec zanieczyszczeniu.




4. Wstrzyknij powietrze do fiolki

Przed włożeniem igły do fiolki pociągnij tłok, aby wprowadzić do strzykawki powietrze w objętości odpowiadającej dawce leku INCRELEX®. Wprowadź igłę przez gumowy korek do fiolki, a następnie wciśnij tłok, aby wstrzyknąć powietrze do fiolki.



5. Pobieranie dawki leku

Zostaw strzykawkę w fiolce i obróć ją do góry dnem. Mocno przytrzymaj strzykawkę i fiolkę. Dopilnuj, żeby końcówka igły znajdowała się w płynie, a następnie pociągnij tłok, żeby pobrać właściwą dawkę do strzykawki.



6. Usuń pęcherzyki powietrza i napełnij strzykawkę

Przed wyciągnięciem igły z fiolki sprawdź, czy w strzykawce nie ma pęcherzyków powietrza. Jeśli są, obróć strzykawkę z igłą i fiolkę do góry dnem i postukaj lekko palcem w bok strzykawki, aż pęcherzyki powietrza przemieścą się do góry. Usuń pęcherzyki, wciskając tłok strzykawki, a następnie ponownie pobierz roztwór do uzyskania właściwej dawki.



7. Lek jest gotowy do podania

Wyjmij igłę z fiolki. Nie dopuść do zetknięcia się igły z jakimkolwiek przedmiotem. Lek jest gotowy do podania.

Podanie dawki leku:

Podaj lek INCRELEX® zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi od lekarza dziecka.

Nie wykonuj iniekcji, jeśli dziecko nie może zjeść w czasie 20 minut poprzedzających iniekcję lub w czasie 20 minut po iniekcji.

8. Wybierz miejsce iniekcji

Zdecyduj, w które miejsce podać lek - możesz wybrać górną część ramienia, udo, pośladek lub brzuch.

Przy każdej kolejnej iniekcji należy zmieniać miejsce podania.

