

KOLONOSKOPIA

EZICLEN®

Koncentrat do sporządzania
roztworu doustnego

Sodu siarczan bezwodny,
magnezu siarczan
siedmiowodny i potasu
siarczan

Lekarz:

Data:

Godzina:

Adres
placówki:

Schemat:

- ☐ **PLAN JEDNODNIOWY:**
2 dawki w dniu PRZED badaniem
- ☐ **PLAN DWUDNIOWY (DAWKA
PODZIELONA):**
1-sza dawka w dniu PRZED
badaniem;
2-ga dawka w dniu badania

► ZNACZENIE ODPOWIEDNIEGO NAWODNIENIA

Ponieważ biegunka powoduje odwodnienie, bardzo ważne jest ścisłe przestrzeganie poniższych zaleceń oraz wypicie odpowiedniej ilości dodatkowych klarownych płynów w celu utrzymania odpowiedniego poziomu nawodnienia.



Można pić dowolne spośród następujących klarownych płynów:

Klarowne płyny, takie jak woda, herbata lub kawa (bez mleka lub śmietanki), napoje niezawierające czerwonych ani fioletowych barwników (gazowane lub niegazowane), sok owocowy (bez miąższu), wywary lub klarowne zupy odcedzone w celu usunięcia składników stałych



NIE WOLNO pić:

Mleka, napojów o barwie czerwonej lub fioletowej, napojów alkoholowych, soków owocowych lub napojów z miąższem

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA

Aby zapewnić skuteczne oczyszczenie jelit i dzięki temu, powodzenie badania, kluczowe znaczenie ma ścisłe przestrzeganie poniższych instrukcji.

W dniu przed badaniem można zjeść lekkie śniadanie, a później na obiad, kolację oraz wszelkie inne posiłki do momentu badania należy pić **WYŁĄCZNIE** klarowne płyny.

JAK STOSOWAĆ EZICLEN®?

Przygotowanie się do badania z użyciem produktu leczniczego Eziclen® polega na przyjęciu 2 dawek zgodnie z następującą sekwencją:

► Data przyjęcia 1-szej
DAWKI:

Rozpoczęto o
godzinie:

1-sza GODZINA



Wlej zawartość jednej
butelki produktu Eziclen®
do kubka.



Dodaj wodę do leku
do poziomu kreski
zaznaczonej na kubku.



Nie spiesz się (w ciągu pół
godziny do godziny)
wypij całość płynu
znajdującego się w kubku.

2-ga GODZINA



WAŻNE
W ciągu kolejnej godziny wypij
jeszcze 2 kubki wody (lub
dozwolonych klarownych płynów).

► Data przyjęcia 2-giej
DAWKI:

Rozpoczęto o
godzinie:


1-sza GODZINA



Wlej zawartość drugiej
butelki produktu
Eziclen® do kubka.



Dodaj wodę do leku
do poziomu kreski
zaznaczonej na kubku.



Nie spiesz się (w ciągu pół
godziny do godziny)
wypij całość płynu
znajdującego się w kubku.

2-ga GODZINA



WAŻNE
W ciągu kolejnej godziny wypij
jeszcze 2 kubki wody (lub
dozwolonych klarownych płynów).

Uwaga:

- W przypadku braku znieczulenia należy przestać pić płyny co najmniej 1 godzinę przed rozpoczęciem badania.
- W przypadku znieczulenia należy przestać pić płyny zazwyczaj co najmniej 2 godziny przed rozpoczęciem badania, uwzględniając instrukcje otrzymane od anestezjologa.

PRZED ZASTOSOWANIEM TEGO LEKU NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ ULOTKI DLA PACJENTA.

Należy pamiętać o wypełnieniu tego formularza i przyniesieniu go lekarzowi w dniu badania.

Poniższa tabela pomoże upewnić się o prawidłowym przestrzeganiu instrukcji oraz zapewni lekarza o odpowiednim przygotowaniu pacjenta do zabiegu.

Proszę uzupełnić wyróżnione w tabeli dni oraz godziny przyjęcia poszczególnych dawek.

Należy postarać się wypić cały preparat i dodatkowe płyny.

► Data przyjęcia 1-szej DAWKI:		
ETAP		GODZINA PRZYJĘCIA
Początek leczenia – ETAPY 1-3 Wlej zawartość pierwszej butelki produktu leczniczego Eziclen® do kubka i rozcieńcz wodą do zaznaczonej na kubku kreski.	  	Godzina przyjęcia pierwszej dawki rozcieńczonego produktu leczniczego Eziclen®:
Wypicie dodatkowej wody lub klarownych płynów – ETAP 4 Wypij 2 kubki wody lub dozwolonych klarownych płynów.		Godzina wypicia pierwszego kubka wody (lub klarownych płynów): Godzina wypicia drugiego kubka wody (lub klarownych płynów):

CZY WYPIŁEŚ CAŁY PREPARAT?	
Tak ☐ Nie ☐ Jeśli NIE , przybliżona przyjęta ilość:	
Wypite klarowne płyny w celu zapewnienia odpowiedniego nawodnienia	
RODZAJ PŁYNU(-ÓW)	CZY WYPIŁEŚ CAŁĄ ZAWARTOŚĆ KUBKA?
Pierwszy kubek	Tak ☐ Nie ☐ Jeśli NIE , przybliżona wypita ilość:
Drugi kubek	Tak ☐ Nie ☐ Jeśli NIE , przybliżona wypita ilość:

► Data przyjęcia 2-giej DAWKI:		
ETAP		GODZINA PRZYJĘCIA
Druga część leczenia – POWTÓRZ ETAPY 1-3 Wlej zawartość drugiej butelki produktu leczniczego Eziclen® do kubka i rozcieńcz wodą do zaznaczonej na kubku kreski.	  	Godzina przyjęcia drugiej dawki rozcieńczonego produktu leczniczego Eziclen®:
Wypicie dodatkowej wody lub klarownych płynów – ETAP 4 Wypij 2 kubki wody lub dozwolonych klarownych płynów.		Godzina wypicia pierwszego kubka wody (lub klarownych płynów): Godzina wypicia drugiego kubka wody (lub klarownych płynów):

CZY WYPIŁEŚ CAŁY PREPARAT?	
Tak ☐ Nie ☐ Jeśli NIE , przybliżona przyjęta ilość:	
Wypite klarowne płyny w celu zapewnienia odpowiedniego nawodnienia	
RODZAJ PŁYNU(-ÓW)	CZY WYPIŁEŚ CAŁĄ ZAWARTOŚĆ KUBKA?
Pierwszy kubek	Tak ☐ Nie ☐ Jeśli NIE , przybliżona wypita ilość:
Drugi kubek	Tak ☐ Nie ☐ Jeśli NIE , przybliżona wypita ilość: